



آنژیوگرافی چشم و آمادگی‌های لازم




مراقبت‌های بعد از آنژیوگرافی

♦ داروی فلورسین رنگی است و باعث تغییر رنگ پوست و ادرار می‌شود. بنابراین باید تا برگشتن رنگ ادرار به حالت طبیعی معمولاً تا ۲۴ ساعت مایعات بیشتری مصرف نمایید.

♦ قطره‌هایی که در چشم شما ریخته شده است باعث تاری دید تا چند ساعت خواهد شد بنابراین بهتر است برای راحتی بیشتر از عینک آفتابی استفاده نمایید.

♦ ممکن است به علت نگاه کردن به نور فلاش دستگاه تا چند دقیقه پخش نور در چشم احساس کنید که کاملاً طبیعی است و با استراحت برطرف می‌شود.



تهران، خیابان شریعتی، جنب اتوبان همت خیابان
شهید داوود گل‌نبی (کتابی) پلاک ۳
واحد آموزش بیمار - مرکز تحقیقات بیمارستان چشم
پزشکی نگاه

☎ ۰۲۱-۲۳۵۵۵

🌐 www.negahhospital.com

📷 [negah.eye.hospital](https://www.instagram.com/negah.eye.hospital)

✉ info@negahhospital.com

در ایام تعطیل و در صورت بروز موارد
اورژانس و عدم دسترسی به پزشک
معالج، می‌توانید به بخش فوریت‌های
شبانه‌روزی بیمارستان فوق تخصصی
چشم پزشکی نگاه مراجعه نمایید.



به بیمارستان نگاه خوش آمدید

با سپاس از اینکه به ما اعتماد دارید و این مرکز را برای درمان خود انتخاب نموده‌اید. مطالبی که پیش رو دارید با هدف آشنایی بیشتر شما با آنژیوگرافی چشم و آمادگی‌های لازم تهیه شده است.

آنژیوگرافی چشم نوعی تصویربرداری برای بررسی عروق خونی شبکیه و تشخیص بیماری‌های چشمی است. توجه داشته باشید که آنژیوگرافی صرفاً یک راه برای تشخیص بیماری است و در درمان آن کاربردی ندارد.

چشم پزشک با استفاده از عکس‌ها می‌تواند عروق شبکیه چشم را بررسی کرده و تغییرات آن را زیر نظر بگیرد. این روش کم‌خطر راهی برای تشخیص بیماری‌هایی مثل رتینوپاتی دیابتی، ورم شبکیه، انسداد عروق، سرطان چشم، تخریب ماکولا به دلیل افزایش سن، چک کردن عروق خونی مشیمیه و... است. پس از تزریق ماده حاجب به بدن از عروق خون‌رسان چشم تصویربرداری صورت می‌گیرد.

آمادگی‌های قبل از آنژیوگرافی

- در صورت داشتن مشکلات زمینه‌ای مثل آسم، مشکلات کلیوی، یا قلبی حتماً در زمان وقت‌دهی اطلاع دهید چون ممکن است نیاز به مشاوره پزشکی وجود داشته باشد.
- لطفاً در زمان تعیین شده در مرکز آنژیوگرافی حضور داشته باشید و با توجه به زمان بر بودن تست، شکیبایی کافی داشته باشید.
- داروهای روتین مصرفی مثل داروهای کاهنده فشارخون و داروهای دیابت طبق برنامه مصرف شود.
- برای تصویربرداری آنژیوگرافی نیاز به ناشتایی نیست و یک وعده غذایی سبک مصرف شود.
- آرایش چشم خود را قبل از آزمایش پاک کند.

- بهتر است یک نفر همراه کنار شما حضور داشته باشد چرا که بعد از ریختن تا مدتی تاری چشم وجود دارد و نباید رانندگی کنید.
- آخرین مدارک و عکس‌های قبلی چشم را همراه داشته باشید.

مراحل انجام آنژیوگرافی

- در صورت وجود مشکلات زمینه‌ای مثل سابقه حساسیت یا آسم یا مشکلات کلیوی باید قبل از انجام تست مشاوره توسط پزشک داخلی یا قلب حاضر در بیمارستان صورت گیرد.
- در ابتدا برای شما قطره‌های بازکننده مردمک ریخته می‌شود و زمان لازم برای تأثیر قطره داده می‌شود.

- پرستار برای شما توضیحات و راهنمایی لازم را جهت تصویربرداری دقیق، ارائه می‌دهد. همکاری شما باعث حفظ زمان مفید و تصویربرداری بهتر و با کیفیت‌تر خواهد بود.
- تزریق داروی فلورسین ممکن است باعث ایجاد حالت تهوع گذرا شود که جای نگرانی نبوده و پس از مدتی برطرف می‌شود.
- اگر بعد از تزریق هر گونه مشکلی مثل خارش پوست و گلو، سرفه یا علائم حساسیت داشتید به پرستار اطلاع دهید. معمولاً واکنش‌های خفیف با مصرف مایعات و داروهای ضد حساسیت ساده برطرف می‌شود و جای نگرانی نیست.

- فرم رضایت برای تزریق ماده حاجب به شما داده می‌شود که بعد از توضیحات می‌باید امضاء نمایید.
- از آنجا که ماده حاجب از طریق رگ‌های دست تزریق می‌شود، دسترسی عروقی با آنژیوکت صورت می‌گیرد.
- شما در مقابل دستگاه مربوطه نشسته و چانه خود را در محل قرار می‌دهید.

